ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Jour 1 : ARRIVÉE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA - COCHABAMBA

Notre voyage commence à **Santa Cruz** où atterrira notre vol international. Nous prendrons immédiatement un vol interne en direction de la cité andine de **Cochabamba** où nous passerons la première nuit de notre voyage.

Jours 2 et 3 : ROUTE DU CHAPARE

Au même titre qu'**Abra Patricia** ou la **route de la Manu** au **Pérou**, la **route du Chapare** possède peu d'équivalents dans le monde ornitho néo tropical. En effet, cet itinéraire propose d'explorer un large spectre d'écosystèmes le long d'un gradient altitudinal depuis les zones de puna au dessus des vallées arides de Cochabamba jusqu'aux plaines d'influences amazoniennes. Nous nous concentrerons essentiellement durant ces deux jours sur les étages intermédiaires et la vaste étendue de forêt de nuages subtropicale, depuis les étages tempérés jusqu'au piémont andin. Plusieurs sentiers pénètrent profondément au cœur de cette végétation humide luxuriante aux arbres ployant sous la charge des mousses et de *Bromeliaceae* épiphytes, aux inextricables patches de bambous *Chusquea*. Nous explorerons ces écosystèmes à la recherche des espèces endémiques et ultra localisées de la région. Au sein des broussailles féeriques et des arbustes moussus de haute altitude, nous tenterons d'observer l'endémique *Synallaxe à gorge noire*. Nous guetterons au sein de l'étage subtropical haut les cris râpeux et sonores du rare et localisé *Toucan à capuchon*. Le *Caïque à ailes noires* est parfois observé en vol sortant de la brume brièvement. Si un coup de téléphone retentit depuis l'épaisse frondaison, nous serons attentifs à la silhouette sombre du magnifique *Solitaire oreillard*. Plus bas en altitude, dans la zone de transition entre le subtropical bas et le piémont, nous entendrons probablement les notes stridentes du rare et localisé *Todirostre de Bolivie*, mais observer ce minuscule *Tyrannidae* requiert une bonne dose de chance et beaucoup de patience. Nous tenterons également d'obtenir de belles vues de la furtive et discrète *Grallaire masquée* qui s'égosille depuis les profondeurs d'un patch de bambous. Beaucoup d'autres espèces excitantes sont présentes le long de ce gradient altitudinal bien que relativement rares et discrètes et nous tenterons de les observer dans de bonnes conditions : *Tinamou à capuchon*, *Tocro de Ballivian*, *Buse solitaire*, *Engoulevent à queue d'aronde*, *Colibri porte-épée*, *Inca violifère*, *Toucanet à ceinture bleue*, *Synallaxe à bandeaux*, *Batara montagnard*, *Grallaire à gorge blanche*, *Tyranneau de Hellmayr* et *Tyranneau de Bolivie*, *Tyranneau à front brun*, *Moucherolle simple*, *Cotinga à queue rayée*, *Cotinga à tête rousse*, *Hirondelle de Chapman*, *Merle ardoisé*, *Calliste à gorge verte*, *Percefleur glauque*, *Tangara trifascié* et *Tangara des bambous*... Nous verrons également bon nombre d'espèces typiques des étages forestiers sub tropicaux andin. Parmi celles-ci figurent : *Merganette des torrents*, *Onoré fascié*, *Milan à queue fourchue*, *Épervier à gorge rayée*, *Pigeon à queue barrée* et *Pigeon plombé*, *Toui d'Orbigny*, *Pione à bec rouge*, *Pione pailletée*, *Pione à tête bleue* et *Amazone mercenaire*, *Martinet à collier*

blanc et *Martinet à collier roux*, *Érione à front bleu*, *Colibri thalassin*, *Métallure à tête rousse*, *Héliange clarisse*, *Quetzal antisien* et *Quetzal doré*, *Cabézon élégant*, *Pic de Rivoli*, *Grimpar à dos olive*, *Synallaxe d'Azara*, *Anabate à sourcils fauves*, *Myrmidon à ventre blanc*, *Grallaire rousse*, *Mérulaxe de Bolivie*, *Tyranneau à croupion fauve* et *Tyranneau des torrents*, *Moucherolle bistré*, *Moucherolle noir*, *Élénie de Pallatanga* et *Élénie à cimier blanc*, *Pipromorphe strié*, *Tyranneau marbré*, *Todirostre gorgeret*, *Moucherolle à gorge rayée*, *Moucherolle à ventre fauve*, *Ada de Jelski*, *Cotinga à huppe rouge*, *Cotinga écaillé* et *Cotinga barré*, *Coracine ornée*, *Coq-de-roche péruvien*, *Manakin des Yungas*, *Cincle à tête blanche*, *Grive tavelée*, *Merle lustré*, *Tangara pillurion*, *Tangara à ventre jaune*, *Tangara des palmiers*, *Tangara à tête bleue*, *Calliste à tête dorée*, *Calliste à nuque d'or*, *Calliste béryl*, *Calliste à cou bleu*, *Tangara ardoisé* et *Calliste bleu et noir*, *Tangara montagnard* et *Tangara à ventre rouge*, *Percefleur masqué*, *Paruline rubanée*, *Cassique olivâtre* et *Cassique roussâtre*, *Cassique cul-jaune* et *Cassique montagnard*, *Chardonneret olivâtre*…Nous aurons l'occasion à la fin de l'une de ces deux journées de visiter la **Laguna Alalay** au cœur de la ville de **Cochabamba**. Nous y observerons un échantillon complet des espèces andines aquatiques : *Grèbe de Rolland* et *Grèbe aux belles joues*, *Érismature des Andes*, *Sarcelle cannelle*, *Sarcelle tachetée* et *Sarcelle de la puna*, *Canard à queue pointue* et *Canard des Bahamas*, *Canard spatule*, *Nette demi-deuil*, *Ibis de Ridgway*, *Râle à bec ensanglanté*, *Vanneau des Andes*, *Mouette des Andes*, *Synallaxe troglodyte* ou *Tyranneau omnicolore*…

Jour 4 : ROUTE DE QUILLACOLLO

Après cette expérience fabuleuse au cœur des écosystèmes luxuriants des **Yungas** boliviens, nous explorerons aujourd'hui un site plus aride situé juste au dessus de la magnifique cité historique de **Cochabamba**. Les sols riches et le climat favorable ont fait de **Cochabamba** l'une des plus importantes villes de **Bolivie**. L'agriculture andine y est développée et nous entamerons notre journée dans un secteur semi-aride à proximité de la ville. À 2600 mètres d'altitude, cette mosaïque de champs de fèves ou de maïs, de versants broussailleux abrupts et de boisements clairs est traversée par la fameuse **route de Quillacollo**. Tout au long de la journée, le long de cette piste poussiéreuse, nous explorerons un gradient altitudinal important depuis les cultures et broussailles arides jusqu'aux immensités rocheuses au dessus du paramó à plus de 4000 mètres d'altitude sous la silhouette imposante du **Cerro Tunari**, l'un des plus haut sommets du pays qui culmine à 5035 mètres d'altitude. Dans des paysages minéraux à couper le souffle, nous ferons une série d'arrêts afin d'explorer en détails l'ensemble du gradient altitudinal. Nous rechercherons en priorité les espèces endémiques et ultra localisées. La star de la journée sera sans conteste l'endémique *Chipiu de Cochabamba* dont les pépiements aigus s'échappent des brous-

sailles denses au bas de la piste. Une espèce que l'on a cru éteinte avant de la redécouvrir il y a quelques années recherche également les buissons en fleur pour s'y nourrir de nectar : le magnifique et rarissime *Colibri adèle*. Le lumineux et éblouissant *Colibri sapho* tente avec succès de lui faire concurrence et nous détaillerons avec attention les reflets bronze et rougeoyants de sa longue queue. Les bosquets clairs et bois de *Polylepis* attirent le rare et localisé *Saltator à ventre roux*. Au sommet de la route, dans des étendues rases parsemées de blocs rocheux nous rechercherons l'énigmatique *Idiopsar à queue courte*. Parmi les autres espèces que nous observeront au cours de l'exploration de ce gradient altitudinal figurent : *Tinamou des Andes*, *Tinamou de Darwin*, *Condor des Andes*, *Thinocore d'Orbigny*, *Colombe de Cécile*, *Toui aymara*, *Martinet des Andes*, *Colibri géant*, *Colibri anaïs*, *Colibri estelle*, *Pic des rochers*, *Upucerthie de Jelski* et *Upucerthie des rochers*, *Synallaxe à tête brune* et *Synallaxe fauve*, *Synallaxe d'Iquico*, *Synallaxe d'Orbigny*, *Synallaxe des rocailles* et *Synallaxe terrestre*, *Synallaxe à front rayé*, *Mérulaxe de Simons*, *Pitajo d'Orbigny*, *Dormilon à bec maculé*, *Dormilon de Junin*, *Dormilon gris*, *Dormilon cendré* et *Dormilon à nuque jaune*, *Gaucho à bec noir* et *Gaucho argentin*, *Moucherolle à croupion roux*, *Hirondelle des Andes*, *Moqueur à dos brun*, *Conirostre géant*, *Percefleur charbonnier*, *Phrygile à tête noire*, *Phrygile petit-deuil*, *Phrygile gris-de-plomb* et *Phrygile plébéien*, *Diuca leucoptère*, *Chipiu de Bolivie*, *Chipiu à flancs roux* et *Chipiu sanglé*, *Cataménie terne*, *Sicale à croupion jaune*, *Paruline basanée*, *Quiscale de Bolivie*…

Jour 5 : COCHABAMBA - LAGO URU URU - INQUISIVI

Tôt ce matin, nous reprendrons la route depuis **Cochabamba** vers **La Paz**. Le long de vertigineux virages en épingles, nous commencerons notre ascension vers les immensités arides et glaciales de l'altiplano, un gigantesque plateau à près de 3700 mètres d'altitude qui s'étend depuis l'ouest de la **Bolivie** jusqu'au sud du **Pérou**. Le long de la route, nous ferons quelques arrêts pour rompre avec la monotonie du voyage. Nous observerons éventuellement le *Moqueur à dos brun*, le *Tinamou orné*, le *Faucon aplomado*, les *Colombe à ailes noires* et *Colombe aymara*, le *Toui à bandeau jaune*, le *Cinclode à ailes blanches*, la *Synallaxe mésange*, la *Synallaxe des rocailles* ou la *Sicale jaune*. Notre destination est la petite ville minière de **Oruro**, située au beau milieu de ce difficile environnement. Nous visiterons l'immense **Lac Uru Uru** situé

à faible distance de la ville. Des preuves géologiques montrent que celui-ci a jadis été connecté au légendaire **Lac Titicaca**. Le principal attrait de ce site est la présence des trois espèces de Flamants sud américains : *Flamant du Chili*, *Flamant des Andes* et *Flamant de James*. Leur présence est largement dépendante du niveau de l'eau dans le lac et elle est donc quelque peu incertaine. D'autres espèces intéressantes fréquentent cette grande zone humide : *Ibis de Ridgway*, *Ouette des Andes*, *Sarcelle tachetée*, *Canard huppé*, *Pluvier de la puna*, *Échasse à queue noire*, *Avocette des Andes*, *Bécasseau de Baird*, *Bécassine de la puna* et *Bécassine de Magellan*, *Thinocore de Patagonie*, *Pigeon tigré*, *Géositte à bec grêle*, *Géositte à ailes rousses* et *Géositte mineuse*, *Cinclode à ailes blanches*, *Synallaxe des rocailles*, *Dormilon à ventre roux* et *Dormilon à calotte rousse*, *Lessonie des Andes*, *Sicale jaune*, *Carouge galonné*…

Après ces observations matinales, le reste de la journée sera consacré à une longue route jusqu'au petit village andin isolé d'**Inquisivi**. Ce village est l'un des deux seuls sites connus pour la rare et ultra localisée endémique *Synallaxe d'Inquisivi*.

Jour 6 : INQUISIVI - RÉSERVE APA APA

Les écosystèmes semi-arides broussailleux autour d'**Inquisivi** abritent une population importante de cette espèce mythique. Son observation n'est normalement pas très difficile. Nous aurons également l'opportunité d'observer une sous-espèce non décrite de la *Conure de Molina* qui fréquente les bois d'*Eucalyptus* au dessus du village. Nous aurons une nouvelle opportunité pour admirer le rare et magnifique *Colibri paméla*. Parmi les autres espèces que nous observerons ce matin figurent : *Tinamou de Darwin*, *Colibri à ventre blanc*, *Conure mitrée*, *Gaucho à bec noir*, *Ada à ailes blanches*, *Chipiu noiroux*, *Cataménie maculée*, *Chardonneret à ventre jaune*… Nous reprendrons notre route en fin de matinée pour un long et chaotique trajet jusqu'à la petite ville andine de **Chulumani** et notre lodge au sein de la **Réserve Apa Apa** au cœur des **Yungas** du nord de la **Bolivie**.

Jour 7 : RÉSERVE APA APA

Malgré une implantation agricole importante, certaines zones de forêt luxuriante ont été préservées. C'est le cas des terrains de la **Réserve Apa Apa** qui abritent de vastes étendues de forêt subtropicale qui s'élèvent au dessus de grandes plantations de *Coca*. Ces forêts humides luxuriantes accueillent un cortège d'espèces typique des **Yungas** d'altitude intermédiaire. Ce site est devenu à la mode dans le monde ornithologique néo tropical principalement en raison de la présence du rare et discret *Piauhau*

à faucilles. Nous ferons un effort particulier pour tenter de repérer cette énigmatique espèce. Bien d'autres espèces excitantes sont présentes dans la réserve parmi lesquelles figurent : *Tinamou à capuchon*, *Conure à pinceaux d'or*, *Toucanet à ceinture bleue*, *Tétéma barré*, *Grallaire masquée*, *Conophage ardoisé*, *Mérulaxe de Bolivie*, *Tyranneau à front brun*, *Moucherolle olive*, *Cotinga chevalier* et *Cotinga à queue rayée*, *Cotinga à tête rousse*, *Manakin des Yungas*, *Tangara ardoisé* et *Calliste à sourcils bleus*, *Tohi à tête rayée*, *Tangara trifascié* et *Tangara aux yeux jaunes*… Cette forêt subtropicale est également le domaine du cortège d'espèces communes typique à cette altitude : *Pénélope des Andes* et *Pénélope de Goudot*, *Aigle d'Isidore*, *Chevêchette des Yungas*, *Inca violifère*, *Quetzal antisien*, *Trogon masqué*, *Tamatia à gorge fauve*, *Pic or*-olive, *Pic de Rivoli* et *Pic enfumé*, *Pione à bec rouge*, *Amazone mercenaire*, *Grimpar à dos olive*, *Anabate montagnard*, *Synallaxe à bandeaux*, *Anabate de Boissonneau*, *Batara montagnard*, *Grallaire ocrée*, *Grallaire rousse*, *Tétéma flambé*, *Pipromorphe strié*, *Tyranneau à gorge blanche* et *Tyranneau de Bolivie*, *Geai indigo*, *Solitaire oreillard*, *Conirostre à cape bleue*, *Tête-de-peluche couronné*, *Tangara à nuque jaune*, *Tangara à ventre jaune*, *Calliste à tête dorée*, *Calliste bleu et noir*, *Calliste béryl*, *Tersine hirondelle* et *Calliste à gorge verte*, *Chlorospin des buissons*, *Paruline trifasciée* et *Paruline citrine*, *Cassique olivâtre*…

Jours 8 et 9 : RÉSERVE APA APA - COROICO - LA PAZ

Les **Yungas** constituent une région forestière de transition entre l'altiplano à près de 4000 mètres d'altitude et les plaines du **Beni** ou amazoniennes. Ces luxuriantes forêts humides tropicales s'étendent depuis les piémonts andins jusqu'aux habitats tempérés d'altitude. Au cours de ces deux journées, nous plongerons au cœur de cet incroyable écosystème. Nous arpenterons un vaste gradient altitudinal depuis **Coroico** jusqu'à **La Paz**. La légendaire et vertigineuse route de **Coroico** est souvent comparée à la route de la **Manu** au **Pérou** par la biodiversité qu'elle renferme et par l'absolue beauté des paysages que nous pourrons observer. Au cours de ces deux jours, nous explorerons en détail chaque étage altitudinal à la recherche des espèces endémiques et localisées les plus intéressantes. Depuis **Chulumani**, nous emprunterons la célèbre "**South Yungas Road**", nous arrêtant en différent sites donnant un accès parfait aux versant monta-

gneux forestiers. Après avoir découvert les sites de la partie basse du gradient altitudinal, nous emprunterons la légendaire "route de la mort" peu fréquentée aujourd'hui jusqu'à **Coroico** point final de ce périple où nous passerons la nuit après avoir découvert les étages de piémont autour de la ville. Le lendemain, nous remonterons lentement vers **La Paz**, explorant les différents étages altitudinaux autour des sites de **Chuspipata**, **Cotopata**, **Pongo** et finalement le col de **La Cumbre** en haute altitude. À travers de luxuriantes forêts tropicales, nous passerons en moins de 80 kilomètres de 500 mètres d'altitude à près de 4600 mètres.

Autour de **Coroico**, les habitats de basse altitude sont le domaine du magnifique *Cabézon élégant*, des bruyantes *Batara mantelé* et *Batara montagnard*, du mignon *Manakin des Yungas* ou du local *Ermite de Prêtre*. Parmi les autres espèces que nous observerons à moins de 1000 mètres d'altitude figurent : *Ortalide maillée*, *Conure de Molina*, *Pione à bec rouge*, *Chouette à lunettes*, *Petit-duc choliba*, *Haut-de-chausses à palettes*, *Pic enfumé*, *Grimpar bec-en-coin*, *Grimpar moucheté* et *Grimpar fauvette*, *Synallaxe de Cabanis*, *Alapi à dos blanc*, *Tyran féroce* et *Tyran pirate*, *Moucherolle à sourcils jaunes*, *Troglodyte à moustaches* et *Troglodyte grivelé*, *Tangara à couronne rouge*, *Tangara sayaca*, *Tangara à bec d'argent* et *Tangara des palmiers*, *Organiste à nuque bleue*, *Sporophile à col double*, *Cassique solitaire*… Les **Yungas** d'altitude intermédiaire autour de **Cotopata** et **Chuspipata** accueillent un bon nombre d'espèces mythiques. Nous guetterons le chant du *Tinamou à capuchon*. Les versants forestiers résonnent des cris rauques du rare *Toucan à capuchon*. Les patches de broussailles denses et de bambous de **Cotopata** accueillent l'endémique *Synallaxe à gorge noire*, le discret *Mérulaxe à diadème*, le minuscule *Tyranneau à front brun*, le mimétique *Todirostre de Bolivie* et le vocal *Tangara des bambous*. Le chorus matinal est un brouhaha de chants et de cris d'une multitude de fabuleuses espèces : *Tocro de Ballivian*, *Chevêchette des Yungas*, *Chouette fasciée*, *Amazone mercenaire* et *Pione pailletée*, *Colombe à gorge blanche*, *Martinet montagnard*, *Colibri moucheté*, *Inca de Gould*, *Héliange clarisse*, *Inca violifère*, *Colibri porte-épée*, *Métallure à queue d'airain*, *Quetzal antisien* et *Quetzal doré*, *Pic à ventre barré*, *Pic de Rivoli*, *Synallaxe à bandeaux*, *Anabasitte perlée*, *Anabate strié*, *Grisin à longue queue*, *Grallaire rousse*, *Tétéma barré*, *Tyranneau de Hellmayr*, *Tyranneau à sourcils blancs* et *Tyranneau à gorge blanche*, *Taurillon mésange*, *Todirostre à gorge noire*, *Moucherolle à poitrine ocre*, *Pitajo noir*, *Pitajo couronné* et *Pitajo à poitrine rousse*, *Moucherolle hirondelle*, *Moucherolle à ventre fauve*, *Cotinga barré* et *Cotinga à queue rayée*, *Troglodyte fauve*, *Geai indigo*, *Tangara de Rieffer* et *Tangara à col d'or*, *Conirostre à ventre roux*, *Percefleur moustachu*, *Tangara aux*

yeux jaunes, *Tangara à couronne rouge*, *Tête-de-peluche couronné*, *Cataménie du paramó*, *Paruline citrine*, *Cassique à bec jaune*…Plus haut en altitude autour des restaurants de bord de route de **Pongo**, nous aborderons les broussailles tempérées avec son cortège de *Synallaxe inca*, *Mérulaxe de Simons*, *Pitajo à dos brun* et *Colibri estelle*, les prairies de la puna où nous rechercheront la discrète *Synallaxe à queue marbrée*, les étincelants *Métallure de Stanley* et *Métallure olivâtre*. Nous atteindrons éventuellement un magnifique bois de *Polylepis*. Nous y observerons un grand nombre d'espèces spécialistes : *Grallaire des Andes*, *Synallaxe fauve*, *Taurillon gris*… Avec un peu de chance dans les secteurs rocailleux bordés de prairies humides, nous pourrons apercevoir la curieuse silhouette du rare *Idiopsar à queue courte*. Enfin, nous arriverons au sommet de la route, le mythique **Col de la Cumbre** où l'objectif principal sera d'observer le localisé *Attagis de Gay*. L'avifaune à plus de 4000 mètres d'altitude est étonnamment diverse : *Grèbe aux belles joues*, *Ouette des Andes*, *Canard huppé*, *Sarcelle tachetée*, *Érismature rousse*, *Caracara montagnard*, *Buse tricolore*, *Thinocore d'Orbigny*, *Vanneau des Andes*, *Mouette des Andes*, *Géositte à bec grêle*, *Synallaxe terrestre*, *Dormilon cendré*, *Dormilon à front blanc* et *Dormilon à nuque jaune*, *Lessonie des Andes*, *Hirondelle des Andes*, *Diuca leucoptère*, *Sicale à croupion jaune*… Nous finirons cette journée au sein de ce magnifique amphithéâtre de près de cinq kilomètres de largeur et de 400 mètres de dénivelé qu'est la capitale la plus haute du monde, **La Paz**.

Jour 10 : LAC TITICACA - SORATA - LA PAZ

Nous nous extirperons aujourd'hui de la tentaculaire **La Paz** sous l'ombre bienveillante des sommets enneigés du gigantesque **Pic Illimani** qui domine la ville. Notre objectif est le célèbre et immense **Lac Titicaca**. Après avoir atteint l'altiplano qui entoure la ville, une bonne route nous conduira directement vers les rives et les eaux bleu profond de cette étendue d'eau qui marque la frontière entre la **Bolivie** et le **Pérou**. Avec en arrière plan une magnifique cordillère enneigée, nous chercherons fébrilement le légendaire *Grèbe microptère*, une espèce ultra localisée et incapable de voler dont l'aire de répartition se limite au lac qui lui donné son nom anglais. Après avoir détaillé le fin plumage ocre et blanc de ce petit *Podicipedidae*, nous observerons l'avifaune typique des lacs andins d'altitude présente autour de nous : *Tinamou orné*, *Grèbe de Rolland*, *Sarcelle cannelle*, *Sarcelle tachetée* et *Sarcelle de la puna*, *Canard à queue pointue*, *Érismature rousse*, *Faucon aplomado*, *Foulque ardoisée*, *Râle à bec ensanglanté*, *Bécassine de la puna*, *Mouette des Andes*, *Colombe de Cécile*, *Pic des rochers*, *Géositte de la puna*, *Synallaxe troglodyte*, *Tyranneau omnicolore*, *Gaucho à bec noir*, *Pipit à plas-*

tron, *Phrygile du Pérou*, *Phrygile petit-deuil et Phrygile à queue barrée*, *Cataménie terne*, *Chardonneret noir*…

Nous entreprendrons plus tard le court trajet longeant le pied de la **Cordillère Illampa** jusqu'au petit village andin et agréable de **Sorata**. Cette vallée aride est le seul site connu pour l'endémique *Synallaxe de Berlepsch*. Les énormes nids construits sur les fourches des *Eucalyptus* sont un bon indice de sa présence. Ces écosystèmes broussailleux semi-arides sont également le domaine d'autres espèces intéressantes : *Colibri anaïs*, *Porte-traîne nouna*, *Ada à ailes blanches*, *Percefleur à gorge noire*, *Tangara à ventre jaune*, *Conirostre cendré*, *Saltator à bec orange*… Nous rentrerons enfin vers **La Paz** en traversant des paysages de puna de haute altitude où nous pourrons faire plusieurs arrêts pour nos dernières observations ornithologiques du voyage : *Ibis à face noire*, *Ibis de Ridgway*, *Caracara montagnard*, *Buse tricolore*, *Faucon pèlerin*, *Crécerelle d'Amérique*, *Foulque géante*, *Vanneau des Andes*, *Colombe à ailes noires*, *Colibri estelle*, *Pic des rochers*, *Upucerthie de Jelski*, *Cinclode à ailes blanches*, i…

Jour 11 : LA PAZ - DÉPART INTERNATIONAL

Le voyage s'achève ce jour avec votre vol international.